



PICOPREP zur Darmspiegelung

Ihr Termin, am um Uhr

Bitte nehmen Sie die Abführmittel wie folgt ein:

- Ein Beutel PICOPREP wird mit ca. 150 ml Wasser verrührt!

Hinweis zu Ihren eigenen Medikamenten

☐

PICOPREP normal

Am Tag vor der Untersuchung

16 Uhr: Einnahme Dulcolax Tablette

17 Uhr: Einnahme 1. Beutel PICOPREP trinken Sie über den Abend verteilt ca. **2-2,5 Liter Flüssigkeit** hinterher.

20 Uhr: Einnahme Ihrer eigenen Medikamente.

Am Untersuchungstag

Kein Frühstück, 1 bis 2 Tassen Tee oder Kaffee sind erlaubt.

Um _____ Uhr: Einnahme 2. Beutel PICOPREP, trinken Sie **1 Liter Flüssigkeit** hinterher.

Um _____ Uhr: Einnahme Ihrer eigenen Medikamente.

Bitte 1 Stunde vor dem Termin nichts mehr trinken!



PICOPREP spät

Am Tag vor der Untersuchung

16 Uhr: Einnahme Dulcolax Tablette

17 Uhr: Einnahme 1. Beutel PICOPREP, trinken Sie über den Abend verteilt ca. **2-2,5 Liter Flüssigkeit** hinterher.

20 Uhr: Einnahme Ihrer eigenen Medikamente.

Am Untersuchungstag

Kein Frühstück, 1 bis 2 Tassen Tee oder Kaffee sind erlaubt.

6 Uhr: Einnahme 2. Beutel PICOPREP, trinken Sie **1 Liter Flüssigkeit** hinterher.

8 Uhr: Einnahme Ihrer eigenen Medikamente.

9 Uhr: Einnahme 3. Beutel PICOPREP, trinken Sie **1 Liter Flüssigkeit** hinterher.

Bitte 1 Stunde vor dem Termin nichts mehr trinken!



PICOPREP Verlängerung

Am Tag vor der Untersuchung

12 Uhr: Einnahme Dulcolax Tablette

13 Uhr: Einnahme 1. Beutel PICOPREP, trinken Sie bis 17:00 Uhr ca. **2 Liter Flüssigkeit** hinterher.

17 Uhr: Einnahme 2. Beutel PICOPREP, trinken Sie über den Abend verteilt ca. **2-2,5 Liter Flüssigkeit** hinterher.

20 Uhr: Einnahme Ihrer eigenen Medikamente.

Am Untersuchungstag

Kein Frühstück, 1 bis 2 Tassen Tee oder Kaffee sind erlaubt.

Um Uhr: Einnahme 3. Beutel PICOPREP, trinken Sie **1 Liter Flüssigkeit** hinterher.

Um Uhr: Einnahme Ihrer eigenen Medikamente.

Bitte 1 Stunde vor dem Termin nichts mehr trinken!



PICOPREP spät + Verlängerung

Am Tag vor der Untersuchung

12 Uhr: Einnahme Dulcolax Tablette

13 Uhr: Einnahme 1. Beutel PICOPREP, trinken Sie bis 17:00 Uhr ca. **2 Liter Flüssigkeit** hinterher.

17 Uhr: Einnahme 2. Beutel PICOPREP, trinken Sie über den Abend verteilt ca. **2-2,5 Liter Flüssigkeit** hinterher.

20 Uhr: Einnahme Ihrer eigenen Medikamente.

Am Untersuchungstag

Kein Frühstück, 1 bis 2 Tassen Tee oder Kaffee sind erlaubt.

6 Uhr: Einnahme 3. Beutel PICOPREP, trinken Sie **1 Liter Flüssigkeit** hinterher.

8 Uhr: Einnahme Ihrer eigenen Medikamente.

9 Uhr: Einnahme 4. Beutel PICOPREP, trinken Sie **1 Liter Flüssigkeit** hinterher.

Bitte 1 Stunde vor dem Termin nichts mehr trinken!